

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen	Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Echinaforce med anwenden.	• Wenn Sie an bestimmten progressiven systemischen Erkrankungen leiden (chronische Erkrankung einiger Organe oder des gesamten Körpers, die immer schwerer wird), Autoimmunerkrankungen (Krankheit, bei der der Körper die körpereigenen Zellen als fremd betrachtet), Immundefekte (ein nicht oder nicht funktionierendes Immunsystem), Immunsuppression (Unterdrückung der natürlichen Abwehrreaktionen gegen körpereigene Substanzen) und Erkrankungen der weißen Blutkörperchen.	• Bei Verschlimmerung der Symptome oder hohem Fieber während der Einnahme von Echinaforce med ist ein Arzt zu Rate zu ziehen.	• Wenn Sie eine genetische Veranlagung für eine Allergie haben, sollten Sie vor der Einnahme von Echinaforce med Ihren Arzt konsultieren.	Kinder Die Einnahme durch Kinder unter 12 Jahren wird nicht empfohlen.	Einnahme von Echinaforce med zusammen mit anderen Arzneimitteln Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.	Es liegen keine Berichte über Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln vor.	Einnahme von Echinaforce med zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken Echinaforce med kann zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken angewendet werden.	Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder	wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.	Die Einnahme während der Schwangerschaft und Stillzeit wird nicht empfohlen.	Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.	Echinaforce med enthält Lactose Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.	Echinaforce med enthält Soja-Polysaccharide Es darf nicht eingenommen/angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Erdnuss oder Soja sind.	3. Wie ist Echinaforce med Tabletten einzunehmen?	Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.	Die empfohlene Dosis beträgt: Kinder über 12 Jahre, Erwachsene und ältere Menschen: • 2-3x pro Tag 1 Tablette einnehmen.	Anwendung bei Kindern Die Einnahme durch Kinder unter 12 Jahren wird nicht empfohlen.	Nur zum Einnehmen. Nehmen Sie nicht mehr als die empfohlene Dosis ein.	Vor der Mahlzeit mit etwas Wasser einnehmen.	Wenn die Symptome länger als 10 Tage anhalten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.	Wenn Sie eine größere Menge von Echinaforce med eingenommen haben, als Sie sollten Falls Sie mehr Echinaforce med eingenommen haben, als Sie sollten, nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt mit Ihrem Arzt, Apotheker oder der Notfallzentrale (070/245.245) auf.	Wenn Sie die Einnahme von Echinaforce med vergessen haben Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben, und nehmen Sie die nächste Dosis zur gewohnten Zeit ein.	Wenn Sie die Einnahme von Echinaforce med abbrechen Es sind keine Auswirkungen zu erwarten, wenn Sie die Einnahme dieses Arzneimittels abbrechen.	Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme des Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.	4. Welche Nebenwirkungen sind möglich? Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.	5. Wie ist Echinaforce med Tabletten aufzubewahren? Haut Überempfindlichkeitsreaktionen wie Hautoausschlag, Nesselsucht, Juckreiz, Anschwellen des Gesichts. Angioödem der Haut (plötzliche Ansammlung von Flüssigkeit in der Haut und Schleimhäuten, z. B. im Hals oder in der Zunge, kann zu Engegefühl und/oder Schwellungen führen).	Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. Nach dem Öffnen der Packung innerhalb von 3 Monaten aufzubrauchen.	Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufzubewahren.
-------------------------------------	---	--	---	---	---	--	---	---	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie	Afleveringswijze Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.	Notice : information de l'utilisateur	Que contient cette notice ? 1. Qu'est-ce qu'Echinaforcemed comprimés et dans quel cas est-il utilisé ? 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Echinaforcemed comprimés ? 3. Comment utiliser Echinaforcemed comprimés ? 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ? 5. Comment conserver Echinaforcemed comprimés ? 6. Contenu de l'emballage et autres informations	Avertissements et précautions Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament. • Si vous souffrez de certaines maladies systémiques évolutives (maladie chronique touchant plusieurs organes ou le corps entier, qui s'aggrave de plus en plus), de certaines maladies auto-immunes (maladie dans laquelle l'organisme considère ses propres cellules comme étrangères), d'immunodéficience (votre système immunitaire ne fonctionne pas ou pas correctement), d'immunosuppression (inhibition des défenses naturelles contre les propres substances de l'organisme) ou de certaines maladies du système des globules blancs. • Si les symptômes s'aggravent ou si vous développez une fièvre élevée pendant l'utilisation d'Echinaforcemed, vous devez consulter un médecin.	Conduite de véhicules et utilisation de machines Les effets du médicament sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n'ont pas été étudiés.	alliez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament.	Si vous avez utilisé plus d'Echinaforcemed que vous n'auriez dû	sévere à certaines substances, entraînant une forte baisse de la pression artérielle, une pâleur, une agitation, un pouls rapide et faible, une peau moite et une diminution de la conscience à la suite d'une vasodilatation soudaine et forte).	6. Contenu de l'emballage et autres informations	Mode de délivrance Médicament non soumis à prescription médicale.	Gebrauchsinformation: Information für Anwender
Welke stoffen zitten er in Echinaforcemed? • De werkzame stof in dit middel is een extract van de Echinacea purpurea plant en wortel (Rode Zonnehoed). • De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn: lactose, zetmeel, soja polysacchariden en magnesiumstearaat.	Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker. Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 03/2024.	Echinaforcemed comprimés Echinacea purpurea	Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.	1. Qu'est-ce qu'Echinaforcemed comprimés et dans quel cas est-il utilisé ?	Echinaforcemed comprimés, est un médicament traditionnel à base de plantes, destiné à soulager les symptômes du rhume.	• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. • Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.	Ce produit est un médicament traditionnel à base de plantes à utiliser selon l'indication spécifiée uniquement sur la base d'une utilisation à long terme.	Echinaforcemed est indiqué chez les adultes et les adolescents de plus de 12 ans.	Enfants L'utilisation chez l'enfant de moins de 12 ans n'est pas recommandée.	Autres médicaments et Echinaforcemed comprimés Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament qu'Echinaforcemed comprimés.	2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Echinaforcemed comprimés ?
Hoe ziet Echinaforcemed eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Echinaforcemed zijn ronde, biconvexe tabletten met een schuine rand met een aromatische geur en een aromatische, zoete en verdovende smaak.	Dit geneesmiddel is verpakt in flessen met 30 tabletten.	Registratiehouder en fabrikant Registratiehouder A.Vogel N.V. Bosstraat 54 bus 7 3560 Lummen België Tel.: +32 (0) 13 35 89 40 Fax.: +32 (0) 13 52 39 41 info@avogel.be	Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.	• Si vous ressentez fortement un des effets indésirables mentionnés à la rubrique 4, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.	• Vous devevez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 10 jours.	• Vous devevez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 10 jours.	• Vous devevez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 10 jours.	• Vous devevez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 10 jours.	Autres médicaments et Echinaforcemed comprimés Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament qu'Echinaforcemed comprimés.	3. Comment utiliser Echinaforcemed comprimés ?	• Si vous êtes allergique à l'un des composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6. • Si vous êtes allergique à l'Echinacea purpurea ou à d'autres plantes de la famille des Asteraceae (Composées). • Si vous êtes allergique aux arachides ou au soja.
Registratiehouder en fabrikant Fabrikant A.Vogel BV J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC Elburg Nederland Tel.: +31 (0) 525 687200 Fax.: +31 (0) 525 683932 registratie@avogel.nl	Registratienummer BE-TU661456	Echinaforcemed comprimés Echinacea purpurea	4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?	Echinaforcemed comprimés avec des aliments et des boissons Echinaforcemed peut être utilisé en association avec des aliments et des boissons.	5. Comment conserver Echinaforcemed comprimés ?	Peau Réactions d'hypersensibilité telles qu'une éruption cutanée, une urticaire, des démangeaisons et un gonflement du visage.	La dose recommandée est de : Enfants de plus de 12 ans, adultes et personnes âgées : • 2-3x par jour 1 comprimé.	6. Comment utiliser Echinaforcemed comprimés ?	Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché A.Vogel S.A. Bosstraat 54 bus 7 3560 Lummen Belgique Tél. : +32 (0) 13 35 89 40 Fax : +32 (0) 13 52 39 41 info@avogel.be	7. Comment conserver Echinaforcemed comprimés ?	Fabricant A.Vogel BV J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC Elburg Pays-Bas Tél. : +31 (0) 525 687200 Fax : +31 (0) 525 683932 registratie@avogel.nl
Registratiehouder en fabrikant Fabrikant A.Vogel BV J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC Elburg Nederland Tel.: +31 (0) 525 687200 Fax.: +31 (0) 525 683932 registratie@avogel.nl	Registratienummer BE-TU661456	Echinaforcemed comprimés Echinacea purpurea	7. Comment conserver Echinaforcemed comprimés ?	Echinaforcemed comprimés avec des aliments et des boissons Echinaforcemed peut être utilisé en association avec des aliments et des boissons.	8. Comment utiliser Echinaforcemed comprimés ?	Peau Réactions d'hypersensibilité telles qu'une éruption cutanée, une urticaire, des démangeaisons et un gonflement du visage.	La dose recommandée est de : Enfants de plus de 12 ans, adultes et personnes âgées : • 2-3x par jour 1 comprimé.	9. Comment conserver Echinaforcemed comprimés ?	Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché A.Vogel S.A. Bosstraat 54 bus 7 3560 Lummen Belgique Tél. : +32 (0) 13 35 89 40 Fax : +32 (0) 13 52 39 41 info@avogel.be	10. Comment utiliser Echinaforcemed comprimés ?	Fabricant A.Vogel BV J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC Elburg Pays-Bas Tél. : +31 (0) 525 687200 Fax : +31 (0) 525 683932 registratie@avogel.nl
Registratiehouder en fabrikant Fabrikant A.Vogel BV J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC Elburg Nederland Tel.: +31 (0) 525 687200 Fax.: +31 (0) 525 683932 registratie@avogel.nl	Registratienummer BE-TU661456	Echinaforcemed comprimés Echinacea purpurea	11. Comment utiliser Echinaforcemed comprimés ?	Peau Réactions d'hypersensibilité telles qu'une éruption cutanée, une urticaire, des démangeaisons et un gonflement du visage.	La dose recommandée est de : Enfants de plus de 12 ans, adultes et personnes âgées : • 2-3x par jour 1 comprimé.	12. Comment utiliser Echinaforcemed comprimés ?	Peau Réactions d'hypersensibilité telles qu'une éruption cutanée, une urticaire, des démangeaisons et un gonflement du visage.	13. Comment utiliser Echinaforcemed comprimés ?	Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché A.Vogel S.A. Bosstraat 54 bus 7 3560 Lummen Belgique Tél. : +32 (0) 13 35 89 40 Fax : +32 (0) 13 52 39 41 info@avogel.be	14. Comment utiliser Echinaforcemed comprimés ?	Fabricant A.Vogel BV J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC Elburg Pays-Bas Tél. : +31 (0) 525 687200 Fax : +31 (0) 525 683932 registratie@avogel.nl
Registratiehouder en fabrikant Fabrikant A.Vogel BV J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC Elburg Nederland Tel.: +31 (0) 525 687200 Fax.: +31 (0) 525 683932 registratie@avogel.nl	Registratienummer BE-TU661456	Echinaforcemed comprimés Echinacea purpurea	15. Comment utiliser Echinaforcemed comprimés ?	Peau Réactions d'hypersensibilité telles qu'une éruption cutanée, une urticaire, des démangeaisons et un gonflement du visage.	La dose recommandée est de : Enfants de plus de 12 ans, adultes et personnes âgées : • 2-3x par jour 1 comprimé.	16. Comment utiliser Echinaforcemed comprimés ?	Peau Réactions d'hypersensibilité telles qu'une éruption cutanée, une urticaire, des démangeaisons et un gonflement du visage.	17. Comment utiliser Echinaforcemed comprimés ?	Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché A.Vogel S.A. Bosstraat 54 bus 7 3560 Lummen Belgique Tél. : +32 (0) 13 35 89 40 Fax : +32 (0) 13 52 39 41 info@avogel.be	18. Comment utiliser Echinaforcemed comprimés ?	Fabricant A.Vogel BV J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC Elburg Pays-Bas Tél. : +31 (0) 525 687200 Fax : +31 (0) 525 683932 registratie@avogel.nl
Registratiehouder en fabrikant Fabrikant A.Vogel BV J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC Elburg Nederland Tel.: +31 (0) 525 687200 Fax.: +31 (0) 525 683932 registratie@avogel.nl	Registratienummer BE-TU661456	Echinaforcemed comprimés Echinacea purpurea	19. Comment utiliser Echinaforcemed comprimés ?	Peau Réactions d'hypersensibilité telles qu'une éruption cutanée, une urticaire, des démangeaisons et un gonflement du visage.	La dose recommandée est de : Enfants de plus de 12 ans, adultes et personnes âgées : • 2-3x par jour 1 comprimé.	20. Comment utiliser Echinaforcemed comprimés ?	Peau Réactions d'hypersensibilité telles qu'une éruption cutanée, une urticaire, des démangeaisons et un gonflement du visage.	21. Comment utiliser Echinaforcemed comprimés ?	Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché A.Vogel S.A. Bosstraat 54 bus 7 3560 Lummen Belgique Tél. : +32 (0) 13 35 89 40 Fax : +32 (0) 13 52 39 41 info@avogel.be	22. Comment utiliser Echinaforcemed comprimés ?	Fabricant A.Vogel BV J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC Elburg Pays-Bas Tél. : +31 (0) 525 687200 Fax : +31 (0) 525 683932 registratie@avogel.nl
Registratiehouder en fabrikant Fabrikant A.Vogel BV J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC Elburg Nederland Tel.: +31 (0) 525 687200 Fax.: +31 (0) 525 683932 registratie@avogel.nl	Registratienummer BE-TU661456	Echinaforcemed comprimés Echinacea purpurea	23. Comment utiliser Echinaforcemed comprimés ?	Peau Réactions d'hypersensibilité telles qu'une éruption cutanée, une urticaire, des démangeaisons et un gonflement du visage.	La dose recommandée est de : Enfants de plus de 12 ans, adultes et personnes âgées : • 2-3x par jour 1 comprimé.	24. Comment utiliser Echinaforcemed comprimés ?	Peau Réactions d'hypersensibilité telles qu'une éruption cutanée, une urticaire, des démangeaisons et un gonflement du visage.	25. Comment utiliser Echinaforcemed comprimés ?	Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché A.Vogel S.A. Bosstraat 54 bus 7 3560 Lummen Belgique Tél. : +32 (0) 13 35 89 40 Fax : +32 (0) 13 52 39 41 info@avogel.be	26. Comment utiliser Echinaforcemed comprimés ?	Fabricant A.Vogel BV J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC Elburg Pays-Bas Tél. : +31 (0) 525 687200 Fax : +31 (0) 525 683932 registratie@avogel.nl
Registratiehouder en fabrikant Fabrikant A.Vogel BV J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC Elburg Nederland Tel.: +31 (0) 525 687200 Fax.: +31 (0) 525 683932 registratie@avogel.nl	Registratienummer BE-TU661456	Echinaforcemed comprimés Echinacea purpurea	27. Comment utiliser Echinaforcemed comprimés ?	Peau Réactions d'hypersensibilité telles qu'une éruption cutanée, une urticaire, des démangeaisons et un gonflement du visage.	La dose recommandée est de : Enfants de plus de 12 ans, adultes et personnes âgées : • 2-3x par jour 1 comprimé.	28. Comment utiliser Echinaforcemed comprimés ?	Peau Réactions d'hypersensibilité telles qu'une éruption cutanée, une urticaire, des démangeaisons et un gonflement du visage.	29. Comment utiliser Echinaforcemed comprimés ?	Titulaire de l'Autorisation de mise sur le		